

Séance du 9 Février 1876.

Présidence de M. PAUL MABILLE.

25 membres présents.

M. Ernest Olivier, de Moulins (Allier), assiste à la séance.

Lecture. M. A. Gaschet, de Bordeaux, adresse un mémoire ayant pour titre : *Observations sur les migrations des Sphingides.*

Dans ce travail, l'auteur discute plus particulièrement les migrations des *Deilephila celerio* et *nerii*, *Sphinx convolvuli* et *Acherontia Atropos*.

Communications. On annonce à la Société que l'un de nos collègues, M. le docteur Charles Robin, vient d'être élu sénateur dans le département de l'Ain.

— M. Lucien Reynaud adresse sa photographie pour l'un des albums de la Société.

— M. le Secrétaire annonce que la 1^{re} partie de l'ouvrage de notre collègue M. J. Künckel *sur l'Organisation et le développement des Volucelles*, qui a obtenu le grand Prix des Sciences physiques de l'Académie des Sciences pour 1875, vient d'être mis en vente.

— Diagnoses d'Hespériens nouveaux (suite), par M. P. Mabille :

14. ISMENE KHODA, sp. nov. — *Quatuor alis nigricantibus, basi obscure fulva; anticis subtus disco nigriore, spatioque albo ad internum marginem, maculaque curva, alba ad apicem. Posticis griseo-nigris, fascia angusta, alba, obliqua ad internum marginem interrupta; angulo anali nigro.* — *Expansio alarum* : 47 mill.

Ex insula « des Pins » dicta.

Proxima I. *vittæ* Buttl. et forsan eadem.

15. ISMENE MOESTISSIMA, sp. nov. — *Omninò nigricans; fimbria pallidiorè, alis inferioribus sinuatis. Alis quatuor subtus fusco-nigricantibus,*

in disco intensius; fascia alba, transversa in posticis, ad angulum analem nigriorem interrupta; corpore capiteque nigris. — Expansio alarum : 52 mill.

Fascia posticarum alba ad alæ basim curvatur cum in præcedenti eadem ad marginem convexa est.

Ex insula Celebes.

16. ISMENE PERPLEXA, SP. NOV. — *Alis quatuor intense nigricantibus, fascia obscure cinerea; alis anticis subtus concoloribus, dilute sordidis ad marginem internum; posticis fascia alba ornatis, ovata, deinde coarctata et interrupta ad marginem internum. Fimbria albescit in sinu. Palpi cinerei. Abdomen cinereo subtus variegatum pectusque virescentibus pilis hirsutum.* — Expansio alarum : 52 mill.

Ex insulis Molucis.

17. ISMENE SIMPLICISSIMA, SP. NOV. — *Quatuor alis fulvo-nigricantibus; corpore nigricante, palpis pectoreque fulvo-rufis. Alis subtus concoloribus, limbo anticarum violaceo, lucido; posticarum basi nigriore, cum macula sordide alba, parva ad sinum.* — Expansio alarum : 48 mill.

Ex insulis Molucis.

18. TAGIADES FUMATUS, SP. NOV. — *Quatuor alis fusco-nigricantibus, nec non corpore toto. Alis anticis subtus fuscis, margine interno usque ad angulum dilutius fusco vel rufescente; posticis limbo nigro-rufescente, rotundatis; palporum articulo ultimo subulato, brevi; antennarum clava, vix hamata, sed potius acumine curvo.* — Expansio alarum : 46 mill.

Ex insulis Philippinis.

19. TAGIADES FULIGO, SP. NOV. — *Quatuor alis fusco-nigris; subtus concoloribus, anticis duas maculas ferentibus, alteram ad costam, alteram in apice, rufecolas; posticis cum spatio antemarginali dilute rufo; fimbria subgrisea.* — Expansio alarum : 40-42 mill.

Ex insula Java.

20. TAGIADES PULLIGO, SP. NOV. — *Quatuor alis fuscis; iisdem subtus dilute fuscis, disco magis fusco. Corpore subtus pallidiore.* — Expansio alarum : 37 mill.

Apud has tres species abdomen alas posticas fere longitudine æquat. In genere *Tagiades* non bene collocatæ, revocant *Plesioneuram* et impri-

mis speciem Europaam *Aracynthus*; genus proprium constituent quod ulterius exponemus.

Ex insula Java.

21. PAMPHILA QUATERNATA, sp. nov. — *Alis olivaceo fuscis; anticis 4 puncta habentibus quorum duo in cellula, alterum ad costam minimum, alterum elongatum; ex duobus alteris, unum est inter primum et secundum ramum nervi compositi inferioris, parvum, quadratum, alterum inter secundum et tertium ramum, majus elongatum et obliquum. Alis subtus subroseo-griseis; anticis basi fuscis, et ad apicem minimorum punctorum nigrorum serie signatis; posticæ duas lineas e punctis nigris formatas habent in disco.* — Expansio alarum : 40 mill.

Ex Senegambia.

Satis vicina *P. dysmephilæ* Trim., sed paulo minor et posticarum inferiori pagina diversa est.

22. PAMPHILA? MUSCA, sp. nov. — *Statura Lycæna alsî Europæ; fusco niger; fimbria pallide fusca. Mas a fæmina differt signo anticarum obliquo. Pagina quatuor alarum subtus impressionem Lycænidarum præbet, scilicet duas in anticis lineas, tenuissimas, punctiformes, antemarginalem unam et marginalem alteram, punctumque in cellula evanidum, omnia cinerea; in posticis duas eadem, et antemarginalem fere circularem in disco, prætereaque duo vel tria ad basim puncta. Angulus abdominalis cinerascit, et ala postica squamis olivaceis variegata est.*

Concinna species, *Ancyloxyphas* referens.

Ex insulis Philippinis.

23. SCELOTHRIX (PYRGUS) ALBISTRIGA, sp. nov. — *Simillimus S. zonæ P. Mab. et S. maculato Brem., sed paulo minor; in alis posticis ad basim tria puncta alba vel interdum quatuor. Subtus alæ omnes fuscæ, inferiores zona alba ad costam interrupta divisæ et puncto albo signatæ ad costam proxime basim; basis inferiorum et costa superiorum ad basim cinerascunt.*

Ex Asia orientali.

Décision. La Société est appelée à prendre une décision sur les conclusions du rapport de la Commission du Prix Dollfus, présenté dans la dernière séance, et dont l'impression a été faite dans le Bulletin n° 68.

M. Goossens présente des observations, et M. le docteur Laboulbène